



Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности

Памятка педагога по основным действиям в случае
детского травматизма или внезапного заболевания

Этапы и объемы оказания помощи



- **Первая помощь** – педагог , оказавшийся свидетелем ЧП. Без лекарств! Вызов Скорой. Остановка кровотечения. Восстановление дыхания. Минимальное действие – вызвать 03 и оставаться с пострадавшим до ее прибытия
- **Первая медицинская помощь** – медик с медикаментами. Это школьная медсестра.
- **Первая доврачебная помощь** – фельдшер с медикаментами и оборудованием (дефибриллятор, тонометр) . Он приедет на машине Скорой помощи



Вызов медиков



Вызов официальных медиков – обязательный шаг для педагогов в любом варианте проблемы со здоровьем ребенка!

Вы можете недооценить степень полученной травмы и последующих реакций организма пострадавшего на боль, саму ситуацию и препараты первой помощи.



Резко начавшиеся ОРВИ



Причина: грипп, детские инфекционные болезни (скарлатина, корь и т.д.)

Признаки: высокая температура, озноб, резкое ухудшение самочувствия, головная боль, боль в горле

Действия:



- изолировать ребенка и обеспечить покой.
- немедленно поставить в известность родителей и выяснить их желание забрать ребенка или согласие на госпитализацию в сопровождении сотрудников школы

Запрещено! Давать жаропонижающие и другие лекарства!

Острые аллергические реакции



Причина: пища, запах растений, бытовой химии и т.д.

Признаки: слезотечение, отек и покраснение глаз, падение артериального давления

Действия:

- Устранение объекта, вызвавшего аллергию (растение, животное, запах краски) – по возможности
- Вызов родителей для выбора дальнейшего лечения у аллерголога
- В случае угрозы отека Квинке – экстренная госпитализация



Запрещено! Давать антигистаминные препараты

Боли в животе



Причина: некачественная еда, колики, аппендицит, у девочек в период menses

Признаки: жалобы на боль в области живота, тошноту, рвоту, понос, ухудшение общего состояния

Действия: Покой в положении лежа



Вызов родителей

При интенсивных или нарастающих болях и общем ухудшении состояния – экстренная госпитализация

Запрещено! проводить пальпацию (ощупывание),
давать спазмолитики и др. препараты


Внезапные обострения



Причина: хронические заболевания

Признаки: жалобы на боли в сердце, одышку и т.д.

Действия: в зависимости от тяжести состояния – передаем на руки родителям или экстренная госпитализация



Запрещено! давать какие либо медикаменты!

Родители обязаны информировать медика школы, классного руководителя и администрацию о наличии хронического заболевания, способного дать внезапный приступ. У астматиков должен быть с собой ингалятор!

Обмороки



Причина: дети не получающие дома завтрак (голодные обмороки), у девочек в период *menses*, подростковая вегето-сосудистая дистония

Признаки: резкая слабость, потемнение в глазах, головокружение, бледность кожи, потеря сознания

Действия:



- Уложить на ровной твердой поверхности, голову не приподнимать. Обеспечить покой
- Ослабить все стягивающие детали одежды (ворот, пояс)
- Приподнять ноги на 30-40 см
- Обеспечить приток свежего воздуха
- Возможна дача теплого сладкого чая после выхода из обморока

Запрещено! использование раствора аммиака (нашатырный спирт)


Истерические припадки



Причина: подростковый возраст, эмоциональный кризис

Признаки: чрезмерное возбуждение, судороги, покраснение или побледнение лица, театральные жесты, быстрая речь, крики

Действия:



- Успокоить, дать выпить воды.
- Изолировать от «зрителей».
- Поставить в известность родителей, порекомендовать обращение к психоневрологу
- В случае выраженных суицидальных намерений и агрессии, аутоагрессии – вызов психиатрической скорой помощи и экстренная госпитализация

Недопустимо потакать ребёнку, идти на поводу.

Эпилептический припадок



Причина: травма головы, соматические и инфекционные заболевания, нарушение обмена веществ

Признаки: кратковременная потеря сознания, судороги, пена из рта, запрокинутая голова, сгибание в локтях и коленях

Действия:



- Придерживаем голову
- Не перемещать
- Убрать из помещения остальных
- Отодвинуть ближайшие травмоопасные предметы
- После прекращения судорог обработать травмы если есть

Запрещено! вставлять что либо между зубами
или разжимать челюсти!

Ушибы, вывихи, переломы, растяжения закрытые ЧМТ



Причина: неудачное падение, наличие опасных участков пола, отсутствие педагогического контроля

Признаки: припухлость, покраснение, синюшность, деформация, отёк

Действия:



- Покой
- Холод
- Неподвижность конечности
- Доставка в травмпункт

Иммобилизируем – только в том случае, если транспортировка проводится своими силами

Отравления аэрозолями



Причина: распыление детьми содержимого баллончиков принесённых в школу

Признаки: тошнота, рвота, понос, потливость, покраснение глаз, слёзы

Действия:



- Промывание носоглотки, кожи, глаз
- Вызов Скорой помощи и МЧС (если в помещении остались следы распыления)

Наркотические и алкогольные интоксикации



Причина: Ребёнок принес в школу и принял запрещённые вещества либо принял дома и отправился в школу

Признаки: кашель, мутные либо красные глаза, заторможенность речи и мышления, бледность, эйфория либо неадекватное поведение

Действия:



- Только вызов Скорой помощи!
- Если возникла рвота уложить на бок и обеспечить уход
- Контролировать дыхание и пульс
- Обеспечить приток свежего воздуха

Запрещено! Оставлять без присмотра и контроля или отправлять одного в туалет !!!! Может потерять сознание и разбить голову об унитаз

Ожоги



Причина: неосторожное обращение с огнём

Признаки: покраснение кожи, небольшой отёк боль (1 степень)
либо покраснение и волдыри с прозрачной жидкостью (2 степень)

Действия: 1 степень: Охладить струей воды либо приложить
холод.
2 степень: Приложить холод, наложить не тугую повязку



Запрещено! Обработать место ожога спиртом, йодом, жиром,
вскрывать пузыри, накладывать тугие повязки

Электротравма



Причина: контакт с оголёнными проводами находящимися под напряжением

Признаки: судорожное сокращение мышц, потеря сознания, остановка дыхания и сердечной деятельности

Действия:



- Выключить электричество
- Отодвинуть провод от пострадавшего деревянным предметом
- При отсутствии дыхания и пульса приступить к сердечно-легочной реанимации

Запрещено! прикасаться к пострадавшему при не отключённом электричестве без защиты

Педагог помни!



Все случаи внезапных состояний регистрируются в журнале дежурного администратора и по ним проводится проверка

Педагог помни!



- Если травма серьёзная: кровотечение, потеря сознания, острые боли в животе и т.д – сразу звоним в Скорую по телефону 103, со своего телефона
- Если дежурный диспетчер не видит повода на выезд (порез пальца), дает официальную рекомендацию и сообщает РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ВЫЗОВА. Его фиксируем. Это документ
- После вызова скорой обязательно связываемся с родителями. Предупреждаем о возможной госпитализации уточняем могут ли родители самостоятельно забрать ребёнка



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!